

ACTIBIOL FLOW

Descrição:

Inseticida concentrado de alta eficácia em baixa concentração contra insetos rastejantes e voadores.

Propriedades:

- Alto poder de desalojamento e efeito derrubante, com excelente residualidade.
- Após a aplicação, a população de insetos diminui em função da espécie em poucas horas ou dias.
- A mortalidade de mosquitos (*Culex spp*) é alcançada em 48 horas. Não mancha, não tem odor.

Pragas:

Insetos rastejantes e voadores.

Material de Proteção:

Luvas, Óculos e Máscara

Características físico-químicas:

Estado físico: Líquido.

Cor: Branco.

Odor: Ligeiramente aromático.

Ponto inicial/faixa de ebulição: 100 °C.

Ponto de inflamação: >100 °C. pH: 6-8 (100%).

Aplicações:

O produto é um concentrado líquido aplicado em toda a área infestada como pulverização grossa para tratamento de superfícies. Deve-se prestar atenção especial a fendas, rachaduras e locais onde os insetos possam se esconder, bem como superfícies onde possam rastejar ou pousar. A aplicação é feita com equipamento manual ou pulverizador de gatilho. O volume apropriado do produto deve ser misturado com a

quantidade necessária de água limpa e agitado. Se houver atraso entre as aplicações, deve-se agitar novamente antes de reutilizar. Para baratas, a taxa de aplicação é de 15mg i.a./m² em locais com alta higiene e baixo nível de infestação. Para alto nível de infestação e/ou condições de baixa higiene, aplicar 30mg i.a./m². Atividade residual e superfícies: O produto tem atividade residual de um mês contra *Lasius niger* (se o resíduo permanecer intacto) e até 3 meses em superfícies não porosas contra vespas. A vida útil pode variar dependendo da limpeza, da natureza da superfície aplicada e do tempo em que o resíduo permanece intacto. O produto não tem atividade residual contra a barata alemã. A atividade contra mosquitos (*Culex spp.*) é eficaz apenas com depósitos frescos em superfícies porosas e não porosas, dependendo da dosagem.

Modo de uso: Leia o rótulo antes de usar. Estime a área que precisa ser tratada. Prepare a solução adicionando o volume apropriado do produto à água limpa e agite. Use o medidor da embalagem ou um dispositivo dosador para medir a quantidade correta. Quando o recipiente estiver vazio, enxágue-o três vezes e use o líquido do enxágue para completar a solução. Aplique o produto com pulverizador manual ou elétrico, produzindo uma pulverização grossa a baixa pressão. Após a aplicação, os insetos devem mostrar sinais de "queda" em 30-60 minutos. A mortalidade das baratas alemãs ocorre em 1 semana após a exposição à superfície tratada. A mortalidade de mosquitos (*Culex spp*) ocorre em 48 horas.

Estratégias de gestão e desenvolvimento de resistências: Sempre que possível, combine tratamentos químicos com medidas não químicas. Para evitar resistência, alterne inseticidas com diferentes modos de ação. Se houver resistência confirmada, interrompa o uso do produto e substitua-o por outro com ação alternativa. Siga as dosagens recomendadas no rótulo para evitar problemas futuros de resistência. Monitorar a eficácia do produto em áreas chave permite detectar mudanças na susceptibilidade e tomar decisões adequadas. Informe ao titular da autorização caso o tratamento seja ineficaz.



Composição:

Alfacipermetrina 6%



Dosagem:

manutenção: 0,5 % (50 ml em 10 litros de água),
ataque forte e maior persistência: 1 %
(100 ml em 10 litros de água).



Apresentação:

50 ml

Autorização de Venda n°: 1407S

Armazenamento:

Armazene conforme a legislação local. Siga as orientações do rótulo. Guarde o produto entre 5 e 25 °C, em local seco e ventilado, longe de fontes de calor e luz solar direta. Mantenha longe de pontos de ignição, agentes oxidantes e materiais altamente ácidos ou alcalinos. Não fume no local. Após abrir a embalagem, feche-a cuidadosamente e guarde na posição vertical para evitar derramamentos.