

## RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO DE USO VETERINÁRIO

### a) NOME DO PUV E INDICAÇÃO DO FIM A QUE SE DESTINA

Intra Repiderma

Produto indicado como coadjuvante no tratamento de afeções da pele e dos cascos

### b) NOME OU DESIGNAÇÃO SOCIAL E DOMICÍLIO OU SEDE DO RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO DE VENDA (AV) E DO FABRICANTE

**Responsável pela autorização de venda e Fabricante:**

Intracare B.V.

Voltaweg 4

5466AZ Veghel

Países Baixos

### c) COMPOSIÇÃO QUALITATIVA

Complexo de Cobre, Complexo de Zinco, Álcool isopropílico, Propileno glicol, Sílica coloidal anidra, Brilliant blue FCF (E133), Curcumine (E100), Mistura butano-propano.

### d) TIPO DE APRESENTAÇÃO E FORMULAÇÃO

Apresentação:

Garrafa de 250 ml

Formulação:

Suspensão verde.

### e) ESPÉCIES ANIMAIS A QUE SE DESTINA

Bovinos, Ovinos, Suínos e Cavalos

### f) INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Intra Repiderma é indicado como adjuvante no tratamento de afeções da pele e cascos. Intra Repiderma é recomendado apenas uso externo.

### g) DOSE E OU MODO DE APLICAÇÃO

Na pele:

Agitar a embalagem antes de usar e aplicar na pele durante 3 segundos a uma distância de 15 a 20 cm, de forma a cobrir a superfície de forma homogeneia. Repetir após 30 segundos se necessário. Permitir um tempo de absorção de pelo menos 30 segundos.

Nos cascos:

Limpar e aparar o casco em excesso. Limpar todo o estrume e sujidade existente no casco e, no espaço interdigital. Aplicar o produto directamente no casco e espaço interdigital, com um pincel, e cobrir com uma ligadura. Ao fim de 3 dias remover a ligadura e aplicar de novo o produto. Se necessário repetir a aplicação ao 7º dia.

### h) DESCRIÇÃO SUCINTA DO MODO DE AÇÃO

Intra Repiderma contem 2 ingredientes que possuem um efeito sinérgico quando combinados. Ambos os componentes são necessários uma vez que têm diferentes ações e fornecem um mecanismo com duas vias para unhas e pele saudáveis. O zinco é utilizado maioritariamente pelo efeito de proteção da pele e fâneros e o cobre é utilizado maioritariamente pelas suas propriedades antimicrobianas.

### i) INTERVALO DE SEGURANÇA

Zero dias para carne, vísceras e leite

### j) CONTRAINDICAÇÕES E REAÇÕES ADVERSAS

Não aplicável.

**l) SOBREDOSAGEM, IDENTIFICANDO SINTOMAS, MEDIDAS DE URGÊNCIA E ANTÍDOTOS**

Desconhecidos

**m) ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS <PARA CADA ESPÉCIE-ALVO>**

Evitar o contacto com os olhos. Não comer, beber ou fumar quando a utilizar o produto.

**n) UTILIZAÇÃO DURANTE A GESTAÇÃO E ALEITAMENTO**

Não aplicável

**o) PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO**

As seguintes medidas de proteção são recomendadas:

Respiratória: Nenhuma

Mãos: Utilizar luvas

Olhos: Utilizar proteção para os olhos/rosto

Pele e corpo: As precauções usuais quando se utilizam químicos devem ser seguidas

**p) EVENTUAIS INTERAÇÕES COM OUTRAS SUBSTÂNCIAS**

Desconhecidas

**q) INCOMPATIBILIDADES**

Desconhecidas

**r) PRAZO DE VALIDADE**

24 Meses após a data de fabrico

**s) PRECAUÇÕES PARTICULARES DE UTILIZAÇÃO**

Não aplicável

**t) PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO E DE TRANSPORTE**

Conservar em local seco e fresco, na embalagem original.

**u) NATUREZA E CONTEÚDO DO RECIPIENTE**

Intra Repiderma é embalado em latas de 250 ml.

**v) PRECAUÇÕES ESPECIAIS PARA ELIMINAÇÃO DOS PRODUTOS NÃO UTILIZADOS OU DOS DESPERDÍCIOS DERIVADOS DESSES PRODUTOS**

O produto de uso veterinário não utilizado ou os seus desperdícios devem ser eliminados de acordo com a legislação em vigor.

Intra Repiderma não deve ser eliminado nos cursos de água, porque pode constituir perigo para peixes e outros organismos aquáticos.

**x) INDICAÇÃO OU JUSTIFICAÇÃO DE QUAISQUER MEDIDAS DE PREVENÇÃO OU DE SEGURANÇA A ADOPTAR**

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

**N.º de AV:** 551/00/14PUVPT

TEXTO PARA CARTONAGEM, ROTULAGEM, LITERATURA INCLUSA

**NOME DO PUV**

Intra Repiderma

**COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS COMPONENTES**

Complexo de Cobre	6 (Mt%) (cobre 0.9 Mt%)
Complexo de Zinco	6 (Mt%) (zinco 0.9 Mt%)
Excipientes	q.b.p. 100 Mt%

**INDICAÇÕES E ESPÉCIES ANIMAIS A QUE O PRODUTO SE DESTINA**

Intra Repiderma é indicado como adjuvante no tratamento de afeções da pele e dos cascos.  
Bovinos, Ovinos, Suínos e Cavalos

**DOSE DE UTILIZAÇÃO**

O Intra Repiderma deve ser utilizado puro.

**MODO DE EMPREGO**

Na pele:

Agitar a embalagem antes de usar e aplicar na pele durante 3 segundos a uma distância de 15 a 20 cm, de forma a cobrir a superfície de forma homogeneia. Repetir após 30 segundos se necessário. Permitir um tempo de absorção de pelo menos 30 segundos.

Nos cascos:

Limpar e aparar o casco em excesso. Limpar todo o estrume e sujidade existente no casco e, no espaço interdigital. Aplicar o produto directamente no casco e espaço interdigital, com um pincel, e cobrir com uma ligadura. Ao fim de 3 dias remover a ligadura e aplicar de novo o produto. Se necessário repetir a aplicação ao 7º dia

**INTERVALO DE SEGURANÇA**

Zero dias para carne, vísceras e leite

**FORMULAÇÃO E CONTEÚDO**

Conteúdo: 250 ml

Formulação: Suspensão verde

**LOTE DE FABRICO**

<Lote> {número}

**NÚMERO DE AV**

551/00/14PUVPT

**NOME OU A DENOMINAÇÃO SOCIAL E O DOMICÍLIO OU A SEDE SOCIAL DO FABRICANTE, DO RIM E DO DISTRIBUIDOR, quando for caso disso**

Responsável pela autorização de venda e Fabricante:

Intracare BV  
Voltaweg 4  
5466 AZ Veghel  
Países Baixos

**PRAZO DE VALIDADE**

<VAL {Mês/Ano}>

**PRECAUÇÕES PARTICULARES DE CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE, se for caso disso**

Conservar em local seco e fresco, na embalagem original.

**PRECAUÇÕES PARTICULARES DE ELIMINAÇÃO DO PRODUTO**

O produto de uso veterinário não utilizado ou os seus desperdícios devem ser eliminados de acordo com a legislação em vigor.

Intra Repiderma não deve ser eliminado nos cursos de água, porque pode constituir perigo para peixes e outros organismos aquáticos

**MENÇÃO “USO VETERINÁRIO”, EM FUNDO VERDE, IMPRESSA NA FACE PRINCIPAL DA ROTULAGEM**

**USO VETERINÁRIO**

**MENÇÃO “MANTER FORA DO ALCANCE E DA VISTA DAS CRIANÇAS” NA FACE PRINCIPAL**

MANTER FORA DO ALCANCE E DA VISTA DAS CRIANÇAS

**MENÇÃO “USO EXTERNO” EM FUNDO VERMELHO, quando for caso disso, IMPRESSA NA FACE PRINCIPAL DA ROTULAGEM**

**USO EXTERNO**